

FICHA TECNICA

FULL TECH'S

CORRECTOR DE CARENCIA



1. CLASE DE USO:

Es un fertilizante foliar con alto contenido de Zinc, quelatado en aminoácidos, ácidos carboxílicos y enriquecidos con extracto de algas marinas, interviene en la formación de órganos reproductores, reproducción de carbohidratos y proteínas.

2. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

Zinc (Zn)	15.00 %
Aminoácidos Totales	7.00 %
Ácidos Carboxílicos	5.00 %
Extracto de Algas Marinas	10.00 %

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUÍMICA:

Estado físico:	Líquido	Color:	Marrón Oscuro
Densidad:	1.195 +/- 0.5	Explosividad:	No explosivo
pH:	3.6 - 3.7	Corrosividad:	No corrosivo

4. RECOMENDACIONES DE USO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Cultivo	Dosis / Ha	Método de Aplicación
Cítricos, paltos, granada, olivo, banana	3.0 - 4.0 litros	Aplicar 15-20 días antes de la floración. Inicio de floración y crecimiento de fruto.
Vid.	3.0 - 4.0 litros	Aplicar 15 - 20 días antes de la floración, si es necesario repetir al inicio de la floración y crecimiento de fruto.
Espárrago	2.0 - 3.0 litros	Aplicar en cada brotamiento con intervalos de 15 días.
Tomate, ají escabeche, Páprika	2.0 - 3.0 litros	Aplicar 12-10 días antes de la floración. Inicio de floración y crecimiento de fruto.
Alcachofa	2.0 - 3.0 litros	A los 30 días de trasplante. Repetir 20 días después de la primera aplicación.
Arroz	2.0 - 3.0 litros	A los 15 días después de la siembra y 15 después de la primera aplicación.
Frijol, pallar, vainita, holantao	2.0 - 3.0 litros	Aplicar al inicio de la floración y crecimiento de vaina.
Sandia, melón, zapallo, pepino	2.0 - 3.0 litros	A los 15 días después de la siembra, pre floración, floración y crecimiento de fruto.
Arándano, fresa	3.0 - 4.0 litros	En el brotamiento Vegetativo. Antes de la floración. Al inicio del cuajado de frutos.
Café, cacao, piña.	2.0 - 3.0 litros	Aplicar al inicio de floración, cuajado y crecimiento de fruto.
Papa, camote	2.0 - 3.0 litros	A los 30 días después de la siembra, repetir a los 15 días después de la primera aplicación.
Cebolla, ajo	2.0 - 3.0 litros	Aplicar a los 30 y 60 días después del trasplante.
Zapallo, pepino	2.0 - 3.0 litros	Aplicar 10 días antes de la floración, si es necesario repetir a los 12 días.
Maíz, trigo.	2.0 - 3.0 litros	Aplicar al estado de 6 hojas. Repetir a los 20 días después.
Algodón.	2.0 - 3.0 litros	Aplicar al inicio de la floración.

5. COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados, excepto con aceites minerales y productos de reacción muy ácida y/o alcalina. Se recomienda realizar una prueba antes de mezclar y consultar al personal técnicamente autorizado.

6. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Garantizamos que la calidad de este producto está conforme con las especificaciones de composición descritas en esta etiqueta. Dado que el uso del mismo está fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados, daños y perjuicios que puedan derivarse de su aplicación.